

Díl čtvrtý: **Kočky a jejich svět**

Při rozhodování jaké plemeno si pořídíme, jistě hraje velkou roli celkový vzhled, délka srsti a výše temperamentu kočky. Doporučujeme navštívit výstavu, která naskýtá perfektní možnost spatřit mnoho plemen na jednom místě a dále lze oslovit mnoho vystavovatelů – chovatelů, kteří většinou jistě velmi ochotně zodpoví různé otázky. Na mnoha místech naší republiky jsou během roku pořádány výstavy opuštěných koček, bez průkazu původu. Před koupí kotěte si u chovatele všimáme stavu prostředí, ve které kotě vyrůstá. Běhá-li všude nespočet koček, nebude to dobré znamení serióznosti. Takový „velkochovatel“ těžko poskytne každému zvířeti tolik lásky a pozornosti, kterou potřebuje v dostatečné míře. Již na samotných koťátkách snadno rozpoznáme jejich duševní stav na tom, zdali jsou bázlivá, nespolečenská a například vystresovaná. U koťátek sledujeme stav kůže a srsti, výživnou kondici, jestli nemají nafouklé břicho, výtok z nosu, očí a u koček z vagíny a celkový tělesný stav. Ideální doba pro odběr kotěte je ve třech měsících života. Kotě už je dostatečně samostatné a připravené na nový domov.

K základní veterinární prevenci náleží odčervení, očkování a prevence před vnějšími parazity:

Odčervení (pasty, tablety, spot on) :

- kočku odčervujeme před plánovaným krytím
- koťata ve věku 21 dní
- druhé odčervení v 6 týdnech
- 1 měsíc po odběru (zajišťuje nový majitel)
- opakovaně 1x za tři měsíce

Základní očkovací schéma:

- první vakcinace v 8 týdnech – panleukopenie, herpesviróza, kaliciviróza
- 2. přeočkování – panleukopenie, herpesviróza, kaliciviróza + doporučená vakcinace vztekliny
- dále vždy 1x za rok – výše zmíněný komplex protilátek, případně lze rozšířit očkování proti chlamydióze, borelióze, leukóze a plísňím
- vystavujeme-li kočku či kocoura, řídíme se podle požadavků uvedených v propozicích pořadatelů

Vnější parazité:

- sledujeme uši kočky, zdali není vnější zvukovod znečištěný hnědým mazem, což svědčí o přítomnosti ušního roztoče – svrabu a to i u jedinců, kteří žijí celoročně v bytě. Diagnostiku provádí veterinární lékař mikroskopickým vyšetřením stěru z uší.
- v kožíšku koček se mohou vyskytovat vnější parazité blechy, vši, všenky, klíšťata, svrab atd.
- na oba případy používáme obojky, spreje, spoty

U všech antiparazitárních přípravků je nutné velmi pečlivě prostudovat návod použití a zjistit tak informaci o možné aplikaci na kočky. Ne všechny přípravky jsou určeny pro kočky. Nesprávné použití může způsobit vážné zdravotní problémy, až úhyn zvířete!!

Kastrace je chirurgický zákrok, kterým se u kocourů mezi 7. – 8. měsícem života vyjmou ze šourku varlata a u koček rovněž v tomto věkovém období se z dutiny břišní odstraní vaječníky a děloha. Dojde tak k přerušení plodnosti natrvalo. Díky této bezpečné metodě nedochází k nežádoucímu oplodnění, kocouři neznačkují svá teritoria, celkově se zvířata zklidní. Nevýhodou bývá obezita. Měli bychom upravit jídelníček a vykastrovaným jedincům podávat speciální stravu, určenou pro kastráty, neboť obsahuje-li krmivo vysoké množství dusíkatých látek, mění se pH moči (ideální stav je v rozmezí 6,1–6,4), jsou drážděny močové cesty, následně dochází k postupné tvorbě močových kamenů. O vhodném krmení se poradíme s veterinářem nebo ve specializovaných obchodech s krmivem a chovatelskými potřebami.

Nastínili jsme základní body péče a prevence koček.

V dubnovém čísle Radnice dáme ve Zvířecím seriálu prostor výchově základní poslušnosti štěňat a mladých psů.

Helena Alexová a MVDr. Ludvík Ransdorf